CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Kuroda.

Srednje kasna sorta crvene boje pokožice, izvrsno podnosi visoke temperature, jako dobrog prinosa.

Tradicionalni

Image:

- **Krupni gomolji**
- **Dobro skladištenje**
- **Otporna na više tipova bradavičaste bolesti krumpira**

Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: G. Kuik
Križanje: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Autorsko pravo: 31-12-2025
Sjeme: KK 83-0216

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6
Svijetla boja klice: plavo ljubičasta / BV
Boja cvijeta: ljubičasta / P
Broj bobica: prosječan / 6
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5
Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
Boja pokožice: crvena / R
Boja mesa: svjetložuta / 6
Glatkoća pokožice: dobar / 7
Oblik gomolja: ovalan / O
Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5
Tuberizacija: umjereno mali / 5
Krupnoća gomolja: krupan / 8
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7
Dormantnost: duga / 8

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7
Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6
Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7
Oštećenje prilikom berbe: osjetljiv / 5
Metribuzin: osjetljiv / 5
Metribuzin: osjetljiv / 5
Bentazon: - / -
Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7
Podvodna težina: 426
Postotak suhe tvari: 23%
Kulinarski tip: brašnast / BC
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): vrlo osjetljiv / 4,5
Oksidacija sirovog krumpira: - / -
Kvaliteta prženih krumpirića: ispodprosječan / 5,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Čips kvaliteta: nije pogodan / 5
TGA razina: -
Karvonsko ulje: 5% do 15% više gomolja / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Preporuke za uzgoj

Gnojidba1 [1]

Dušik: standardne preporuke + 10%.
Fosfat: standardne preporuke.
Kalij: standardne preporuke + 20%.

Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja.Proizvoljno jednokratno uklanjanje klice.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za dugotrajno skladištenje.

Image:

Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 6
Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 7
Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7
Prskanje: umjereno osjetljiv / 7
Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5
Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5
Fusarium (suha trulež): umjereno do neosjetljiv / 8
Obična krastavost: osjetljiv / 5
Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2
Virus - A: umjereno do neosjetljiv / 9
Virus - X: osjetljiv / 5,5
Nagnječenje: - / -
Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6
Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10
Bradavičasta bolest krumpira F6: malo osjetljiv / 9
Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -
Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9
Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -
Nematoda Pa 2: - / -
Nematoda Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com