CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Napoleon.

Kasna sorta za proizvodnju čipsa, ujednačene veličine gomolja i visokog postotka suhe tvari.

Prerada
Čips

Image:

- **Dobra kvaliteta za proizvodnju čipsa**
- **Pogodna za proizvodnju pahuljica**
- **Dobra otpornost na viruse**

Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: ANTINA x ALICANTE
Autorsko pravo: 31-12-2051
Sjeme: AR 10-4637

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: kasna berba / 5
Svijetla boja klice: crveno ljubičasta / RV
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: vrlo visok / 4
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5
Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svjetložuta / 6,5
Glatkoća pokožice: umjereno loš / 5
Oblik gomolja: okruglo ovalan / RO
Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7
Tuberizacija: prosječan / 6
Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7,5
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7
Dormantnost: prosječna / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Nagnječenje (unutarnje): osjetljiv / 5,5
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6
Oštećenje prilikom berbe: vrlo osjetljiv / 4,5
Metribuzin: malo osjetljiv / 7
Metribuzin: malo osjetljiv / 7
Bentazon: - / -
Etilen: 5% manje do 5% više gomolja / 5
Podvodna težina: 450
Postotak suhe tvari: 24,1%
Kulinarski tip: brašnast / BC
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6
Oksidacija sirovog krumpira: umjereno osjetljiv / 6
Kvaliteta prženih krumpirića: dobar / 7
Raspodjela suhe tvari: dobra / 7
Čips kvaliteta: izvrstan / 8
TGA razina: 4,0
Karvonsko ulje: 25% više gomolja / 8

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Preporuke za uzgoj

Gnojidba1 [1]

Dušik: standardne preporuke - 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 20%.

Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja.Uklanjanje klice može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporučuje se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 9 °C. Prikladno za srednje dugo to dugotrajno skladištenje.

Image:

Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): umjereno do neosjetljiv / 8

Prskanje: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) lista: umjereno osjetljiv / 6

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6,5

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): - / -

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: osjetljiv / 4

Nematoda Pa 3: osjetljiv / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com