CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Constance.

Varietà di patata da consumo di seconda precoce, a buccia giallo brillante e pasta di colore giallo chiaro.

- **Bellissimo aspetto della buccia**
- **Tubero di calibro uniforme**
- **Polpa compatta in dopo la cottura**

Dettaglio Fresco

Tradizionale

Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: J.L. Spijkman

Incrocio: MARABEL x AR 93-1243

Diritti dei selezionatori: 31-12-2044

Plantula: SA 02-0020

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: semi-precoce / 7

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: blu viola / BV

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: medio / 6

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7

Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6,5

Colore della buccia: giallo / Y

Colore della polpa: giallo paglierino / 6,5

Finitura della buccia: eccellente / 8

Forma del tubero: ovale tonda / OR

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: media / 6

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: regolare / 7

Dormienza: media / 6,5

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7

Black spot (annerimento interno): sensibilità scarsa o assente / 8

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: molto sensibile / 4,5

Metribuzin: poco sensibile / 7

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Bentazone: sensibilità scarsa o assente / 8

Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7

Peso in acqua: 358

Contenuto in sostanza secca: 19,7%

Consistenza in cottura: abbastanza compatta / AB

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: abbastanza sensibile / 6,5

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: sotto la media / 5,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 4

Livello di GAT: 4,3

Olio di cumino: dal 5% a più del 15% dei tuberi / 6

Dormienza: media / 6,5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione [1]

Azoto: raccomandazione standard + 15%.
Fosfato: raccomandazione standard.
Potassio: raccomandazione standard + 15%.

Trattamento del seme

Un adeguato pregermogliamento dopo la rimozione delle gemme apicali può favorire lo sviluppo di più steli.La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 27 cm (50.000 piante/ha)
35/55 mm: 36 cm (37.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e raramente una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno tre settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5

Say potato, say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -
Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8
Virus - Yntn (tubero): poco suscettibile / 6,5
Necrosi anulare del tubero: poco suscettibile / 6
Peronospora tardiva-apparato fogliare: suscettibile / 5
Peronospora tardiva-tubero: molto suscettibile / 4,5
Fusarium: poco suscettibile / 6,5
Scabbia comune: poco suscettibile / 6
Scabbia polverulenta: molto suscettibile / 3
Virus - A: - / -
Virus - X: poco suscettibile / 7
Antracnosi: poco suscettibile / 7
Erwinia: poco suscettibile / 6
Rogna nera F1: - / -
Rogna nera F6: - / -
Rogna nera F18: - / -
Nematode dorato Ro 1/4: - / -
Nematode dorato Ro 2/3: - / -
Nematode bianco Pa 2: - / -
Nematode bianco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com