CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Esmee.

Korai, piros héjú, bőtermő étkezési fajta jó szárazszságtűrő képességgel.

- **Gyönyörű kinézet**
- **Nagyméretű gumók**
- **Többféle vírus rezinsztencia**

Piaci szegmens - Kiskereskedelem
Friss piac

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: LAURA x RODEO

Magonc: AR 01-0410

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: korai / 6,5

Fénycsíra színe: vöröses lila / RV

Virág színe: világos lila / LP

Bogyók száma (termés): kimondottan magas / 4

Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7

Lombozat - kifejlett állapot: dús / 7,5

Lombozat - szilárdság: eléggé szilárd / 7

Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7

Héj szín: piros / R

Hús szín: sárga / 7

Héj minőség: kiváló / 8

Gumóforma: ovális-hosszúkás / OL

Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6,5

Gumókötésszám: átlagos / 6

Gumóméret: nagy méretű / 8

Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7

Nyugalmi idő: átlagos / 6

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6,5

Szürkülés (mechanikai behatástól): nem vagy csak kissé érzékeny / 8

Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6

Betakarításkori sérülékenység: eléggé érzékeny / 6,5

Metribuzin - kelés előtt: kimondottan érzékeny / 4

Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7

Bentazon: kissé érzékeny / 7

Etilén: 5%-kal kevesebb vagy több gumó / 5

Vízalatti súly: 326

Szárazanyag taratlom: 18%

Főzési típus: nem szétfővő / AB

Szürkülési hajlam (főzéskor): érzékeny / 5,5

Elszíneződési hajlam: eléggé érzékeny / 6

Sütési minőség: átlagos / 6

Szárazanyag eloszlás: - / -

Chips minőség: nem megfelelő / 4

TGA-szint: 8,2

Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7

S_Dormancy: átlagos / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség + 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető.A csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Tőtávolság

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után metribuzin (Sencor) használata tilos, károsítja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 ºC. Közepesen hosszú ideig tárolható.

Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: kimondottan fogékony / 4
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4,5
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 7
Fuzárium: kissé fogékony / 7
Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6
Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5
A-vírus: - / -
X vírus: nem vagy csak kissé fogékony / 8
Kolletotrichumos megbetegedés: fogékony / 5,5
Ervinia: kissé fogékony / 7
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: - / -
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: - / -
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com