CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Esmee.

ایک خوبصورت سُرخ داغ کی دوسری اگیتی پکانے والی قسم، گرمی کی پتر برداشت اور اچھےپیداوار۔

روایتی

خوردہ (پوچون) raljo

- خوبصورت ظاہر شکل
- بڑے آلو
- متعدد اقسام کے وائرس کے خلاف مزاحمت



خصوصیات

عمومی خصوصیات

قسم تیار کرنے والے: Agrico Research B.V.
ہائبرڈ اسلاف: LAURA x RODEO
قسم تیار کرنے والے کا حق: 31-12-2043
پیٹنٹ: AR 01-0410

پودے اور آلو کی خصوصیات

پختگی: دوسری اگیتی / 6,5
سوئے کا ہلکا رنگ: سرخ بنفشی / RV
پھول کا رنگ: ہلکا جامنی / LP
بیریز کی تعداد: پت زیادہ / 4
پتے - ابتدائی نشوونما: کچھ تیز / 7
پتے - تمام نشوونما: کچھ اچھا / 7,5
پتے - مضبوطی: کچھ مضبوط / 7
پتے - انتخاب کی ہلیت: کچھ آسان / 7
چھلکے کا رنگ: سرخ / R
جلد کا رنگ: پیلا / 7
چھلکے کی عمدگی: پتریں / 8
آلو کی شکل: بیضوی لمبا / OL
آلو کی شکل کی یکسانیت: کچھ باقاعدہ / 6,5
آلو بننے کا عمل: درمیانہ / 6
آلو کی جسامت: بڑا / 8
جسامت کی یکسانیت: باقاعدہ / 7
سست رو (غیر فعالیت): درمیانہ / 6

حساسیت اور معیار

ٹانوں نمو: کچھ حساس / 6,5
سیاہ دھبہ (اندرونی داغ): معمولی سے غیر حساس / 8
بڑھوتری کی دراڑیں: کچھ حساس / 6
کٹائی کے دوران نقصان: کچھ حساس / 6,5
میٹریبوزن: پت حساس / 4
میٹریبوزن: معمولی سی حساس / 7
ینیٹلزون: معمولی سی حساس / 7
ایتھیلین: 5% کم سے 5% زیادہ آلو / 5
زیر آب وزن: 326
خشک مادے کی مقدار: 18%
کھانا پکانے کی قسم: قدرے سخت / AB
سرمئی بدرنگی (کھانا پکانے کے بعد): حساس / 5,5
خام بدرنگی: کچھ حساس / 6
آلو کے چپس (فرینچ فرائز) کا معیار: اوسط / 6
خشک مادے کی تقسیم: - / -
خستگی کا معیار: غیر موزوں / 4
ڈی جی اے - درجہ: 8,2
کارووِن کا تیل: 15% سے 25% زیادہ آلو / 7

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

کاشت کی ہدایات

کھاد کا استعمال [1]
نائٹروجن: تجویز کردہ مقدار + 10%۔
فاسفیٹ: تجویز کردہ معیار۔
پوٹاشیم: تجویز کردہ معیار۔

بیج کی کاٹ چھانٹ
ترجیحاً کولڈ سٹور سے باہر تھوڑے وقت تک درجہ حرارت دینے کے بعد، براہ راست ہوا جا سکتا ہے۔ سوکھے کو کاٹنے سے پیداوار اور جماعت کی باقاعدگی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔

بوائی کا فاصلہ
28/35 ملی میٹر: فی ہیکٹر (67.000 پودے): 25-30 انچ، کھیلیاں 4-6 انچ، پودے
35/55 ملی میٹر: فی ہیکٹر (54.000 پودے): 25-30 انچ، کھیلیاں 4-6 انچ، پودے

جڑ بوٹیاں
زمین سے باہر نکلنے کے بعد، میٹریبوزن (سینکور) کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے پتوں پر شدید رد عمل ہوتا ہے اور پیداوار میں شدید کمی ہو سکتی ہے۔

پھپھوندی کُش ادویات
پچھیتا جھلساؤ کے خلاف درست حفاظتی چھڑکاؤ کا سختی سے خیال رکھا جائے۔

فصل کی کٹائی
سیلہ دھبے اور/یا کٹائی کے دوران پہنچنے والے نقصان کی شدت کی وجہ سے، بیلوں کو کاٹنے کے بعد فصل کی کٹائی سے پہلے کم از کم تین ہفتے تک انتظار کریں۔

ذخیرہ کاری کا درجہ حرارت - ذخیرہ کاری کا وقت
ذخیرہ کاری کا ترجیحی درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے درمیانی مدت کی ذخیرہ کاری کے لیے موزوں ہے۔

Say potato, say Agrico.

مزاحمتیں
وائرس - پتوں کا مڑ جانا: - / -
وائرس - Yn: معمولی سے غیر اثر پذیر / 8
وائرس - Yntn (آلو): معمولی سی اثر پذیر / 7
چھڑکاؤ: پتہ اثر پذیر / 4
پچھیتا جھلساؤ - پتے: پتہ اثر پذیر / 4,5
پچھیتا جھلساؤ - آلو: معمولی سی اثر پذیر / 7
فیوزاریم (پھپھوندی): معمولی سی اثر پذیر / 7
خاکہ کھرنڈ (چترل): معمولی سی اثر پذیر / 6
سفوفی کھرنڈ (چترل): معمولی سی اثر پذیر / 6,5
وائرس - A: - / -
وائرس - X: معمولی سے غیر اثر پذیر / 8
سیلہ نکتہ: اثر پذیر / 5,5
اروینیا: معمولی سی اثر پذیر / 7
مسے کی بیماری F1: مزاحم / 10
مسے کی بیماری F6: - / -
مسے کی بیماری F18: - / -
سنہری خیطہ کیچوا Ro 1: - / -
سنہری خیطہ کیچوا Ro 2/3: - / -
سفید خیطہ کیچوا Pa 2: - / -
سفید خیطہ کیچوا Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com