CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Rudolph.

Középkorai, szép piros héjú, szárazságtűrő, kimondottan bőtermő fajta.

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac

- **Fehér hússzín**
- **Nagyméretű gumók**
- **Jól tárolható**

Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: CHIEFTAIN x STIRLING
Magonc: UK 93-1-2

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: középkorai / 5,5
Fénycsíra színe: vöröses lila / RV
Virág színe: világos lila / LP
Bogyók száma (termés): átlagos / 6
Lombozat - kezdeti fejlődés: átlagos / 6
Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8
Lombozat - szilárdság: szilárd / 8
Lombozat azonosíthatósága: átlagos / 6,5
Héj szín: piros / R
Hús szín: fehér / 4
Héj minőség: jó / 7
Gumóforma: ovális-kerek / OR
Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6
Gumókötésszám: átlag alatti / 5
Gumóméret: nagy méretű / 8
Gumóméret egyenletessége: szabályos / 7
Nyugalmi idő: hosszú / 7

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6,5
Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7
Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6
Betakarításkori sérülékenység: eléggé érzékeny / 6
Metribuzin - kelés előtt: nem vagy csak kissé érzékeny / 8
Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5
Bentazon: - / -
Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6
Vízalatti súly: 376
Szárazanyag taratlom: 20,5%
Főzési típus: nem szétfővő / AB
Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6,5
Elszíneződési hajlam: - / -
Sütési minőség: átlag feletti / 6,5
Szárazanyag eloszlás: - / -
Chips minőség: átlag alatti / 5,5
TGA-szint: 5,5
Karvon olaj: 15-25%-kal több gumó / 7
S_Dormancy: hosszú / 7,5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség + 5%.Több ütemben kijutattva, a második kezelés közvetlenül a gumókötést követően javasolt.

Foszfát: Standard mennyiség.

Kálium: Standard mennyiség + 10%.

Gumókezelés

Rövid hősokk vagy előcsíráztatás ajánlott.A csúcsrügy eltávolítása utáni előcsíráztatás pozitívan hathat a gumóképzésre.Egyszeri csírátlanítás lehetséges.

Tőtávolság

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban befolyásolhatja a lombozatot és a termést.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Betakarítás

A mechanikai sérülések/kolletotrichumos megbetegedés elkerülése érdekében a betakarítást leghamarabb a szártalanítást követő 3 héttel javasolt megkezdeni.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 ºC. Feldolgozásra alkalmas fajta, 7 ºC felett tárolandó. Hosszú ideig tárolható.

Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: fogékony / 5
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: kissé fogékony / 7
Lombfitoftóra: fogékony / 5,5
Gumó fitoftóra: fogékony / 5,5
Fuzárium: kissé fogékony / 6
Sugárgombás varasodás: fogékony / 5
Poros varasodás: kissé fogékony / 7
A-vírus: - / -
X vírus: kissé fogékony / 6
Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 7
Ervinia: kissé fogékony / 6
Burgonyarák F1: nem fogékony / 10
Burgonyarák F6: mérsékelten fogékony / 8
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: - / -
Arany fonálféreg Ro 2/3: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: - / -
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com