

# Jolene.

Varietà di patata da consumo precoce, con buona finitura della buccia e adatta alla frittura domestica.


- ▶ **Varietà multiuso**
- ▶ **Bella finitura della buccia**
- ▶ **Tuberi uniformi**
- ▶ **Forte resistenza ai virus**



**Dettaglio**  
Fresco



**Tradizionale**



## characteristics

### Caratteristiche generali

Selezionatore: Agrico Research B.V.  
 Incrocio: SAGITTA x AR 03-1491  
 Diritti dei selezionatori: 31-12-2050  
 Plantula: AR 09-2556

### Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6  
 Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: rosso / R  
 Colore dei fiori: bianco / W  
 Numero di bacche: sotto la media / 7  
 Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: molto rapido / 7,5  
 Apparato fogliare - Sviluppo finale: buono / 8  
 Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7,5  
 Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6  
 Colore della buccia: giallo / Y  
 Colore della polpa: giallo paglierino / 6  
 Finitura della buccia: buona / 7  
 Forma del tubero: ovale lunga / OL  
 Regolarità della forma del tubero: regolare / 7  
 Tuberizzazione: abbastanza alta / 7  
 Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7,5  
 Regolarità del calibro: regolare / 7  
 Dormienza: media / 6

### Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7  
 Black spot (annerimento interno): poco sensibile / 7  
 Crepe di crescita: poco sensibile / 7  
 Danneggiamento da raccolta: abbastanza sensibile / 6  
 Metribuzin: abbastanza sensibile / 6,5  
 Metribuzin: sensibilità scarsa o assente / 8  
 Bentazone: - / -  
 Etilene: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7  
 Peso in acqua: 389  
 Contenuto in sostanza secca: 21,1%  
 Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B  
 Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5  
 Scolorimento da cruda: poco sensibile / 7  
 Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: buona / 7  
 Distribuzione della sostanza secca: - / -  
 Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 5  
 Livello di GAT: 6,9  
 Olio di cumino: dal 15% a più del 25% dei tuberi / 7  
 Dormienza: media / 6  
 Tasso di mutazione: Questa varietà può mostrare un elevato tasso di mutazione. Pertanto, l'uso dell'olio di cumino è sconsigliato. / Use of carvone oil can provoke mutations.

# How to grow



## Fertilizzazione <sup>1</sup>

**Azoto:** raccomandazione standard.

**Fosfato:** raccomandazione standard.

**Potassio:** raccomandazione standard + 10%.

## Trattamento del seme

Può essere seminata subito dopo lo stoccaggio a freddo, preferibilmente dopo un breve shock termico. La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 piante/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

## Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) può determinare una lieve reazione sull'apparato fogliare e una lieve riduzione della resa.

## Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

## Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

## Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Adatta alla conservazione a medio termine.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenze

**Virus - Accartocciamento fogliare:** - / -

**Virus - Yn:** suscettibilità scarsa o assente / 8

**Virus - Yntn (tubero):** suscettibilità scarsa o assente / 8

**Necrosi anulare del tubero:** poco suscettibile / 6

**Peronospora tardiva-apparato fogliare:** molto suscettibile / 4

**Peronospora tardiva-tubero:** suscettibile / 5

**Fusarium:** poco suscettibile / 6

**Scabbia comune:** poco suscettibile / 6

**Scabbia polverulenta:** poco suscettibile / 6,5

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Antracnosi:** poco suscettibile / 7,5

**Erwinia:** - / -

**Rogna nera F1:** - / -

**Rogna nera F6:** - / -

**Rogna nera F18:** - / -

**Nematode dorato Ro 1/4:** - / -

**Nematode dorato Ro 2/3:** - / -

**R\_Golden nematode Ro 5:** - / -

**Nematode bianco Pa 2:** - / -

**Nematode bianco Pa 3:** - / -