CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Ditta.

Monipuolinen varhaisperuna, joka soveltuu tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen viljelyyn.

- **Erinomainen kuluttajalaatu**
- **Hyvä varastoitavuus**
- **Hyvä vastustuskyky**

Luomu

Vähittäiskauppa
Pakkaus
Salaatti



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Jalostaja: BINTJE x QUARTA
Jalostajan oikeudet: Vanhentunut
Taimi: SW 80-0540

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: pitkä soikea / LO
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: melko pitkä / 7

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Bentazon: melko herkkä / 6,5
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 369
Kuiva-ainepitoisuus: 20,2%
Keittolaatu: kiinteä / A
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatummuminen: erittäin herkkä / 4
Ranskalaisten laatu: alle keskiarvon / 5,5
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 4
TGA-taso: -

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi - 10 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen.Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)
35/50 mm: 27 cm (50.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiinin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran reaktioita lehdissä, mutta harvoin sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 5 ºC. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.

Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 7
Virus - Yn: hieman altis / 7,5
Virus - Yntn (mukula): altis / 5
Ruoste: altis / 5
Perunarutto - varsisto: altis / 5,5
Perunarutto - mukula: hieman altis / 7
Fusarium: hieman altis / 6
Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Kuorirokko: hieman altis / 6,5
Musta piste: hieman altis / 6
Syylätauti F1: kestävä / 10
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com